

# 【福島市の骨粗鬆症検診について】

福島市では、X線を用いて骨の量や成分(骨密度)を測定する骨密度測定法による骨粗鬆症検診を実施しています。

## ◎検査方法

検査方法には DIP 法、DXA 法の 2 種類があり、実施医療機関により異なります。

### <DIP 法(骨塩定量検査法)>

・手に X 線を照射し解析する方式です。

福島市内の実施医療機関の多くが DIP 法による検査を行っています。

結果が「要精密検査」となった場合には、精密検査実施医療機関を受診し、DXA 法による精密検査を受ける必要があります。

### <DXA 法(二重エネルギーX 線吸収測定法)>


・2種類の異なるエネルギーの X 線を照射し、橈骨、大腿骨及び腰椎のいずれか又は 2 か所に骨とその他組織を区別して、その差で骨密度を測定する方法です。

DXA法を実施する医療機関は限られます。

DXA法による検査を行った場合でも、結果が「要精密検査」となった場合には、DXA 法による精密検査が再度必要である場合もあります。

※DIP 法と DXA 法のいずれでも骨粗鬆症検診の自己負担額は変わりません。

詳しくは、市民検診実施医療機関に直接お問い合わせ下さい。



◎対象者 福島市に住民登録のある年度内40、45、50、55、60、65、70歳の方

◎自己負担金 1,000円

◎実施方法 年1回 医療機関に直接予約

◎持ち物 市民検診受診券 マイナ保険証もしくは資格確認書

#### ◎骨粗鬆症とは？

骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。日本には約 1000 万人以上の患者さんがいるといわれており、高齢化に伴ってその数は増加傾向にあります。

#### ◎症状

骨粗鬆症になっても、痛みはないのが普通です。しかし、転ぶなどのちょっとしたはずみで骨折しやすくなります。骨折が生じやすい部位は、背骨(脊椎の圧迫骨折)、手首の骨(橈骨遠位端骨折)、太ももの付け根の骨(大腿骨頸部骨折)などです。骨折が原因で、要介護状態となることもあります。

まずは骨粗鬆症検診を受診し、自分の骨の状態について知ることから始めましょう！

## ◎福島市のこれまでの骨粗鬆症検診結果について

### 1. 検診の受診状況の推移

(単位:人)

|      | H28年度  | H29年度  | H30年度  | H31年度  | R2年度   | R3年度   | R4年度   | R5年度   | R6年度   | R7年度   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象者数 | 19,933 | 19,584 | 19,584 | 19,584 | 19,584 | 12,794 | 12,884 | 12,844 | 12,417 | 12,170 |
| 受診者数 | 2,571  | 2,743  | 2,737  | 2,620  | 2,239  | 2,132  | 2,132  | 1,985  | 2,000  | 1,870  |
| 受診率  | 12.9%  | 14.0%  | 14.0%  | 13.4%  | 11.4%  | 16.7%  | 16.5%  | 15.5%  | 16.1%  | 15.4%  |


#### ●福島市の骨粗鬆症検診の対象者:

平成17年度～令和2年度:年度末年齢が20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳

令和3年度～:年度末年齢が、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳

#### ●対象者数について、H28年度からR2年度までの対象者は国勢調査をもとに算出。

R3年度からは県が作成したがん検診推定対象者数としている。



### 2. 検診で実施した検査方法の推移

(単位:人)

|           | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | R2年度  | R3年度  | R4年度  | R5年度  | R6年度  | R7年度  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DIP/人     | 1,409 | 1,557 | 1,534 | 1,479 | 1,263 | 997   | 930   | 873   | 1,047 | 938   |
| DXA1か所    | 1,162 | 1,186 | 1,203 | 1,141 | 976   | 890   | 899   | 854   | 701   | 679   |
| DXA2か所    |       |       |       |       |       | 245   | 303   | 258   | 252   | 253   |
| DXA精検(再)※ |       |       |       |       | 220   | 180   | 196   | 195   | 229   | 154   |
| 計         | 2,571 | 2,743 | 2,737 | 2,620 | 2,239 | 2,132 | 2,132 | 1,985 | 2,000 | 1,870 |
| DXA検査率    | 45.2% | 43.3% | 44.0% | 43.6% | 53.4% | 61.7% | 65.6% | 65.8% | 59.1% | 58.1% |

#### ●DXA法1か所: 腰椎又は大腿骨のいずれかで測定

DXA法2か所: 腰椎又は大腿骨の両方で測定

DXA精検※: 1次検査でDIP法、2次検査(精密検査)でDXA法を実施した人数。

(令和2年度から精密検査制度を施行し、DIP法で要精検となった方については、2次医療機関に紹介し、DXA法による精密検査を実施することとした。)

### 3. 検診結果区分

(単位:人)

|      | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | R2年度  | R3年度  | R4年度  | R5年度  | R6年度  | R7年度  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 異常なし | 1,861 | 1,903 | 1,873 | 1,774 | 924   | 825   | 745   | 721   | 767   | 688   |
| 要指導  | 467   | 567   | 548   | 561   | 578   | 587   | 572   | 518   | 535   | 514   |
| 要精検  | 243   | 273   | 316   | 285   | 737   | 720   | 815   | 746   | 698   | 668   |
| 計    | 2,571 | 2,743 | 2,737 | 2,620 | 2,239 | 2,132 | 2,132 | 1,985 | 2,000 | 1,870 |

●(1次)検診の結果による区分を示す。

●令和元年度まで:骨粗鬆症の判断基準を参考に「異常なし」「骨量減少」「骨粗鬆症」を判定した。


表は「骨量減少」を要指導、「骨粗鬆症」を要精検と置き換えている。

※YAM 値 70%以下を骨粗鬆症としていた。

令和2年度から:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015 版」に従い、医療面接と骨量測定の結果から「異常なし」「要指導」「要精検」の判定をすることとした。

※YAM 値 80%未満を要精検とした。

※YAM 値(若年成人平均値):20~44 歳の健康な女性の骨密度を 100%として、現在の骨密度が何%であるかを比較した数字。



### 4. 年齢別にみた検診結果の状況

【R2 年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 異常なし | 要指導 | 要精検 | 総計   | 異常なし  | 要指導   | 要精検   | 総計     |
|-------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| 20歳   | 10   | 4   | 2   | 16   | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 100.0% |
| 25歳   | 10   | 1   |     | 11   | 90.9% | 9.1%  | 0.0%  | 100.0% |
| 30歳   | 25   | 3   |     | 28   | 89.3% | 10.7% | 0.0%  | 100.0% |
| 35歳   | 40   | 3   | 1   | 44   | 90.9% | 6.8%  | 2.3%  | 100.0% |
| 40歳   | 126  | 28  | 1   | 155  | 81.3% | 18.1% | 0.6%  | 100.0% |
| 45歳   | 117  | 21  | 11  | 149  | 78.5% | 14.1% | 7.4%  | 100.0% |
| 50歳   | 143  | 35  | 10  | 188  | 76.1% | 18.6% | 5.3%  | 100.0% |
| 55歳   | 124  | 64  | 39  | 227  | 54.6% | 28.2% | 17.2% | 100.0% |
| 60歳   | 110  | 94  | 87  | 291  | 37.8% | 32.3% | 29.9% | 100.0% |
| 65歳   | 99   | 143 | 201 | 443  | 22.3% | 32.3% | 45.4% | 100.0% |
| 70歳   | 120  | 182 | 385 | 687  | 17.5% | 26.5% | 56.0% | 100.0% |
| 計     | 924  | 578 | 737 | 2239 | 41.3% | 25.8% | 32.9% | 100.0% |

## 【R3 年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 異常なし | 要指導 | 要精検 | 総計   | 異常なし  | 要指導   | 要精検   | 総計     |
|-------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| 40歳   | 125  | 34  | 9   | 168  | 74.4% | 20.2% | 5.4%  | 100.0% |
| 45歳   | 110  | 26  | 16  | 152  | 72.4% | 17.1% | 10.5% | 100.0% |
| 50歳   | 170  | 35  | 27  | 232  | 73.3% | 15.1% | 11.6% | 100.0% |
| 55歳   | 106  | 62  | 46  | 214  | 49.5% | 29.0% | 21.5% | 100.0% |
| 60歳   | 102  | 101 | 76  | 279  | 36.6% | 36.2% | 27.2% | 100.0% |
| 65歳   | 106  | 162 | 195 | 463  | 22.9% | 35.0% | 42.1% | 100.0% |
| 70歳   | 106  | 167 | 351 | 624  | 17.0% | 26.8% | 56.3% | 100.0% |
| 総計    | 825  | 587 | 720 | 2132 | 38.7% | 27.5% | 33.8% | 100.0% |

## 【R4 年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 異常なし | 要指導 | 要精検 | 総計   | 異常なし  | 要指導   | 要精検   | 総計     |
|-------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| 40歳   | 98   | 31  | 10  | 139  | 70.5% | 22.3% | 7.2%  | 100.0% |
| 45歳   | 85   | 22  | 8   | 115  | 73.9% | 19.1% | 7.0%  | 100.0% |
| 50歳   | 137  | 49  | 31  | 217  | 63.1% | 22.6% | 14.3% | 100.0% |
| 55歳   | 131  | 63  | 43  | 237  | 55.3% | 26.6% | 18.1% | 100.0% |
| 60歳   | 90   | 120 | 119 | 329  | 27.4% | 36.5% | 36.2% | 100.0% |
| 65歳   | 100  | 112 | 269 | 481  | 20.8% | 23.3% | 55.9% | 100.0% |
| 70歳   | 104  | 175 | 335 | 614  | 16.9% | 28.5% | 54.6% | 100.0% |
| 総計    | 745  | 572 | 815 | 2132 | 34.9% | 26.8% | 38.2% | 100.0% |

## 【R5年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 異常なし | 要指導 | 要精検 | 総計   | 異常なし  | 要指導   | 要精検   | 総計     |
|-------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| 40歳   | 77   | 20  | 7   | 104  | 74.0% | 19.2% | 6.7%  | 100.0% |
| 45歳   | 96   | 26  | 6   | 128  | 75.0% | 20.3% | 4.7%  | 100.0% |
| 50歳   | 138  | 54  | 23  | 215  | 64.2% | 25.1% | 10.7% | 100.0% |
| 55歳   | 139  | 53  | 63  | 255  | 54.5% | 20.8% | 24.7% | 100.0% |
| 60歳   | 90   | 89  | 123 | 302  | 29.8% | 29.5% | 40.7% | 100.0% |
| 65歳   | 96   | 119 | 207 | 422  | 22.7% | 28.2% | 49.1% | 100.0% |
| 70歳   | 85   | 157 | 317 | 559  | 15.2% | 28.1% | 56.7% | 100.0% |
| 総計    | 721  | 518 | 746 | 1985 | 36.3% | 26.1% | 37.6% | 100.0% |

## 【R6年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 異常なし | 要指導 | 要精検 | 総計   | 異常なし  | 要指導   | 要精検   | 総計     |
|-------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| 40歳   | 80   | 21  | 8   | 109  | 73.4% | 19.3% | 7.3%  | 100.0% |
| 45歳   | 92   | 30  | 12  | 134  | 68.7% | 22.4% | 9.0%  | 100.0% |
| 50歳   | 184  | 48  | 34  | 266  | 69.2% | 18.0% | 12.8% | 100.0% |
| 55歳   | 128  | 57  | 48  | 233  | 54.9% | 24.5% | 20.6% | 100.0% |
| 60歳   | 86   | 87  | 115 | 288  | 29.9% | 30.2% | 39.9% | 100.0% |
| 65歳   | 103  | 133 | 179 | 415  | 24.8% | 32.0% | 43.1% | 100.0% |
| 70歳   | 94   | 159 | 302 | 555  | 16.9% | 28.6% | 54.4% | 100.0% |
| 総計    | 767  | 535 | 698 | 2000 | 38.4% | 26.8% | 34.9% | 100.0% |

【R7年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 異常なし | 要指導 | 要精検 | 総計   | 異常なし  | 要指導   | 要精検   | 総計     |
|-------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| 40歳   | 84   | 27  | 5   | 116  | 72.4% | 23.3% | 4.3%  | 100.0% |
| 45歳   | 88   | 24  | 11  | 123  | 71.5% | 19.5% | 8.9%  | 100.0% |
| 50歳   | 148  | 49  | 23  | 220  | 67.3% | 22.3% | 10.5% | 100.0% |
| 55歳   | 123  | 72  | 48  | 243  | 50.6% | 29.6% | 19.8% | 100.0% |
| 60歳   | 103  | 92  | 115 | 310  | 33.2% | 29.7% | 37.1% | 100.0% |
| 65歳   | 69   | 94  | 206 | 369  | 18.7% | 25.5% | 55.8% | 100.0% |
| 70歳   | 73   | 156 | 260 | 489  | 14.9% | 31.9% | 53.2% | 100.0% |
| 総計    | 688  | 514 | 668 | 1870 | 36.8% | 27.5% | 35.7% | 100.0% |

## 5. 年齢別にみた精密検査結果

【R2 年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少   | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診    | 総計     |
|-------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20歳   | 1     |        |            |            | 1      | 2      |
| 35歳   |       | 1      |            |            |        | 1      |
| 40歳   |       |        |            |            | 1      | 1      |
| 45歳   | 4     | 2      | 1          |            | 4      | 11     |
| 50歳   | 2     | 3      | 1          |            | 4      | 10     |
| 55歳   | 5     | 16     | 8          |            | 10     | 39     |
| 60歳   | 6     | 17     | 17         | 1          | 46     | 87     |
| 65歳   | 14    | 45     | 58         | 1          | 83     | 201    |
| 70歳   | 28    | 54     | 106        | 1          | 196    | 385    |
| 計     | 60    | 138    | 191        | 3          | 345    | 737    |
| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少   | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診    | 総計     |
| 20歳   | 50.0% | 0.0%   | 0.0%       | 0.0%       | 50.0%  | 100.0% |
| 35歳   | 0.0%  | 100.0% | 0.0%       | 0.0%       | 0.0%   | 100.0% |
| 40歳   | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%       | 0.0%       | 100.0% | 100.0% |
| 45歳   | 36.4% | 18.2%  | 9.1%       | 0.0%       | 36.4%  | 100.0% |
| 50歳   | 20.0% | 30.0%  | 10.0%      | 0.0%       | 40.0%  | 100.0% |
| 55歳   | 12.8% | 41.0%  | 20.5%      | 0.0%       | 25.6%  | 100.0% |
| 60歳   | 6.9%  | 19.5%  | 19.5%      | 1.1%       | 52.9%  | 100.0% |
| 65歳   | 7.0%  | 22.4%  | 28.9%      | 0.5%       | 41.3%  | 100.0% |
| 70歳   | 7.3%  | 14.0%  | 27.5%      | 0.3%       | 50.9%  | 100.0% |
| 計     | 8.1%  | 18.7%  | 25.9%      | 0.4%       | 46.8%  | 100.0% |

## 【R3 年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
|-------|-------|-------|------------|------------|-------|--------|
| 40歳   | 2     | 2     | 4          |            | 1     | 9      |
| 45歳   |       | 7     | 1          |            | 8     | 16     |
| 50歳   | 4     | 7     | 4          |            | 12    | 27     |
| 55歳   | 3     | 10    | 12         |            | 21    | 46     |
| 60歳   | 3     | 9     | 31         | 1          | 32    | 76     |
| 65歳   | 19    | 39    | 64         |            | 73    | 195    |
| 70歳   | 32    | 53    | 106        |            | 160   | 351    |
| 計     | 63    | 127   | 222        | 1          | 307   | 720    |
| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
| 40歳   | 22.2% | 22.2% | 44.4%      | 0.0%       | 11.1% | 100.0% |
| 45歳   | 0.0%  | 43.8% | 6.3%       | 0.0%       | 50.0% | 100.0% |
| 50歳   | 14.8% | 25.9% | 14.8%      | 0.0%       | 44.4% | 100.0% |
| 55歳   | 6.5%  | 21.7% | 26.1%      | 0.0%       | 45.7% | 100.0% |
| 60歳   | 3.9%  | 11.8% | 40.8%      | 1.3%       | 42.1% | 100.0% |
| 65歳   | 9.7%  | 20.0% | 32.8%      | 0.0%       | 37.4% | 100.0% |
| 70歳   | 9.1%  | 15.1% | 30.2%      | 0.0%       | 45.6% | 100.0% |
| 計     | 8.8%  | 17.6% | 30.8%      | 0.1%       | 42.6% | 100.0% |

## 【R4 年度】

(単位:人)

| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
|-------|-------|-------|------------|------------|-------|--------|
| 40歳   | 2     | 1     |            | 4          | 3     | 10     |
| 45歳   | 2     | 2     |            |            | 4     | 8      |
| 50歳   | 4     | 5     |            | 6          | 16    | 31     |
| 55歳   | 8     | 12    |            | 4          | 19    | 43     |
| 60歳   | 30    | 19    |            | 10         | 60    | 119    |
| 65歳   | 59    | 42    | 2          | 16         | 150   | 269    |
| 70歳   | 67    | 62    | 1          | 36         | 169   | 335    |
| 計     | 172   | 143   | 3          | 76         | 421   | 815    |
| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
| 40歳   | 20.0% | 10.0% | 0.0%       | 40.0%      | 30.0% | 100.0% |
| 45歳   | 25.0% | 25.0% | 0.0%       | 0.0%       | 50.0% | 100.0% |
| 50歳   | 12.9% | 16.1% | 0.0%       | 19.4%      | 51.6% | 100.0% |
| 55歳   | 18.6% | 27.9% | 0.0%       | 9.3%       | 44.2% | 100.0% |
| 60歳   | 25.2% | 16.0% | 0.0%       | 8.4%       | 50.4% | 100.0% |
| 65歳   | 21.9% | 15.6% | 0.7%       | 5.9%       | 55.8% | 100.0% |
| 70歳   | 20.0% | 18.5% | 0.3%       | 10.7%      | 50.4% | 100.0% |
| 計     | 21.1% | 17.5% | 0.4%       | 9.3%       | 51.7% | 100.0% |

【R5年度】

| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
|-------|-------|-------|------------|------------|-------|--------|
| 40歳   |       | 3     |            | 2          | 2     | 7      |
| 45歳   | 1     | 1     |            |            | 4     | 6      |
| 50歳   | 3     | 8     |            | 3          | 9     | 23     |
| 55歳   | 14    | 21    | 1          | 3          | 24    | 63     |
| 60歳   | 42    | 32    |            | 11         | 38    | 123    |
| 65歳   | 72    | 42    | 1          | 23         | 69    | 207    |
| 70歳   | 106   | 62    | 1          | 35         | 113   | 317    |
| 計     | 238   | 169   | 3          | 77         | 259   | 746    |
| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
| 40歳   | 0.0%  | 30.0% | 0.0%       | 20.0%      | 20.0% | 100.0% |
| 45歳   | 12.5% | 12.5% | 0.0%       | 0.0%       | 50.0% | 100.0% |
| 50歳   | 9.7%  | 25.8% | 0.0%       | 9.7%       | 29.0% | 100.0% |
| 55歳   | 32.6% | 48.8% | 2.3%       | 7.0%       | 55.8% | 100.0% |
| 60歳   | 35.3% | 26.9% | 0.0%       | 9.2%       | 31.9% | 100.0% |
| 65歳   | 26.8% | 15.6% | 0.4%       | 8.6%       | 25.7% | 100.0% |
| 70歳   | 31.6% | 18.5% | 0.3%       | 10.4%      | 33.7% | 100.0% |
| 計     | 29.2% | 20.7% | 0.4%       | 9.4%       | 31.8% | 100.0% |

【R6年度】

| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
|-------|-------|-------|------------|------------|-------|--------|
| 40歳   | 1     | 4     |            | 1          | 2     | 8      |
| 45歳   | 3     | 2     |            | 1          | 6     | 12     |
| 50歳   | 10    | 11    |            | 2          | 11    | 34     |
| 55歳   | 17    | 20    |            | 3          | 8     | 48     |
| 60歳   | 41    | 32    |            | 7          | 35    | 115    |
| 65歳   | 62    | 45    |            | 17         | 55    | 179    |
| 70歳   | 114   | 62    | 1          | 34         | 91    | 302    |
| 計     | 248   | 176   | 1          | 65         | 208   | 698    |
| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
| 40歳   | 10.0% | 40.0% | 10.0%      | 0.0%       | 20.0% | 100.0% |
| 45歳   | 37.5% | 25.0% | 0.0%       | 12.5%      | 75.0% | 100.0% |
| 50歳   | 32.3% | 35.5% | 0.0%       | 6.5%       | 35.5% | 100.0% |
| 55歳   | 39.5% | 46.5% | 0.0%       | 7.0%       | 18.6% | 100.0% |
| 60歳   | 34.5% | 26.9% | 0.0%       | 5.9%       | 29.4% | 100.0% |
| 65歳   | 23.0% | 16.7% | 0.0%       | 6.3%       | 20.4% | 100.0% |
| 70歳   | 34.0% | 18.5% | 0.3%       | 10.1%      | 27.2% | 100.0% |
| 計     | 30.4% | 21.6% | 0.2%       | 7.9%       | 25.5% | 100.0% |

【R7年度】

| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
|-------|-------|-------|------------|------------|-------|--------|
| 40歳   | 0     | 3     | 0          | 0          | 2     | 5      |
| 45歳   | 2     | 5     | 0          | 0          | 4     | 11     |
| 50歳   | 7     | 6     | 0          | 1          | 9     | 23     |
| 55歳   | 12    | 15    | 0          | 6          | 15    | 48     |
| 60歳   | 39    | 40    | 0          | 6          | 30    | 115    |
| 65歳   | 62    | 78    | 0          | 20         | 46    | 206    |
| 70歳   | 98    | 63    | 1          | 28         | 70    | 260    |
| 計     | 220   | 210   | 1          | 61         | 176   | 668    |
| 年度末年齢 | 骨粗鬆症  | 骨量減少  | 骨粗鬆症<br>以外 | 異常を認<br>めず | 未受診   | 総計     |
| 40歳   | 0.0%  | 60.0% | 0.0%       | 0.0%       | 40.0% | 100.0% |
| 45歳   | 18.2% | 45.5% | 0.0%       | 0.0%       | 36.4% | 100.0% |
| 50歳   | 30.4% | 26.1% | 0.0%       | 4.3%       | 39.1% | 100.0% |
| 55歳   | 25.0% | 31.3% | 0.0%       | 12.5%      | 31.3% | 100.0% |
| 60歳   | 33.9% | 34.8% | 0.0%       | 5.2%       | 26.1% | 100.0% |
| 65歳   | 30.1% | 37.9% | 0.0%       | 9.7%       | 22.3% | 100.0% |
| 70歳   | 37.7% | 24.2% | 0.4%       | 10.8%      | 26.9% | 100.0% |
| 計     | 32.9% | 31.4% | 0.1%       | 9.1%       | 26.3% | 100.0% |