

## 5種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ）

☆ジフテリア（D）は、口やのどに細菌がとりついて発症します。体内に広がると命にかかわることもあります。

☆百日せき（P）は、せきが長くつづくことが特徴の病気です。小さなお子さんがかかると命にかかわることもあります。

☆破傷風（T）は、土の中にいる菌が傷口から入って発症し、病気が進むと体内の筋肉がかたくなってしまいます。重くなると息ができなくなり、命にかかわることもあります。

☆ポリオ（IPV）は、便に触れた手や指などを介して感染する病気で、手や足が動かせなくなり、場合によっては一生続くことがあります。

☆ヒブ（Hib）に感染すると、肺炎、細菌性髄膜炎（脳を包んでいる膜の炎症）、菌血症（菌が血液に入り高熱が出る）、喉頭蓋炎（のどの奥がはれて息ができなくなってしまうことがある）などを引き起こすことがあります。

☆5種混合ワクチン（DPT-IPV-Hibワクチン）を接種することで、体のなかにジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブへの免疫（抵抗力）ができます。

☆このワクチンは生後2か月から接種を始めます。

☆5種混合ワクチン（DPT-IPV-Hibワクチン）は不活化ワクチンです。

### ■予防接種の受け方

#### いつ受けるの？

接種年齢：生後2か月以上7歳6か月未満  
（標準的な接種年齢：1期初回の開始が生後2か月以上7か月未満）

#### どこで？

福島市登録医療機関に予約してください

#### 持っていくものは？

母子健康手帳、5種混合予防接種予診票、  
子ども医療費受給資格者証など

#### 回数と間隔は？

**1期初回1回目**（生後2か月以上）

↓ 1回目から20日以上あける  
（標準的な接種間隔：20～56日）

**1期初回2回目**

↓ 2回目から20日以上あける  
（標準的な接種間隔：20～56日）

**1期初回3回目**

↓ 3回目から6か月以上あける  
（標準的な接種間隔：3回目から6か月以上18か月未満）

**1期追加**

↓

**2種混合（ジフテリア・破傷風）2期**（11歳以上13歳未満）

小学6年生で通知します

### ■おこるかもしれない体の変化（副反応）

●5種混合ワクチン（DPT-IPV-Hibワクチン）を接種した後、接種個所が赤くなったり、はれたり、しこりができたりすることがあります。

●熱がでたり、おなかをこわしたりするほか、ぶつぶつができたり、のどが赤くなることもあります。

●極めてまれに、アナフィラキシー（急激なアレルギー反応）やけいれん、血小板減少性紫斑病（かさぶたをつくる働きの血小板が少なくなって、出血しやすくなる）、脳炎などの重い症状があらわれることがあります。

○予防接種を受けた後、気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐに接種した医師に相談してください。

